

Tableau des antigènes⁵

	BVD de type 1	BVD de type 2	IBR	PI3	BRSV	<i>H. somni</i>	<i>M. haemolytica</i>	<i>P. multocida</i>	Leptospira (5 antigènes, plus l'excrétion rénale du type hardjo-bovis)	<i>Vibrio (C. fœtus)</i>	<i>Clostridium</i> (7 antigènes)	<i>E. coli</i>	Adjuvant	Protection des fœtus contre la BVD	Protection respiratoire à dose unique	Dose unique contre les infections des appareils reproducteurs par les virus de l'IBR/la BVD	Protection à dose unique contre la leptospirose	Dose	Voie d'administration
Express® FP 5 10 ou 50 doses	A	A	A	A	A								Oui					2 mL	s.c i.m
Express® FP 5/ Somnugen® 10 ou 50 doses	A	A	A	A	A	T							Oui					2 mL	s.c
Express® FP 10 10 ou 50 doses	A	A	A	A	A				T				Oui					2 mL	s.c i.m
Express® FP 5-VL5 10 ou 50 doses	A	A	A	A	A				T	T			Oui					2 mL	s.c i.m
Express® Feedlot 10 ou 50 doses	A	A	A	A	A								Oui					2 mL	s.c
Express® Yearling 50 doses	A	A	A										Oui					2 mL	s.c i.m
Pyramid® FP 5 10 ou 50 doses	A	A	A	A	A								Oui*					2 mL	s.c
Pyramid® FP 10 10 doses	A	A	A	A	A				T				Oui*					2 mL	s.c
Pyramid® FP 5 + Preresponse® SQ 10 ou 50 doses	A	A	A	A	A		T						Oui*					2 mL	s.c
Pyramid® 2 + Type II BVD 50 doses	A	A	A										Oui*					2 mL	s.c
Preresponse® HM 50 doses							T	T					Oui					2 mL	i.m
Preresponse® SQ 50 doses							T						Oui*					2 mL	s.c
Triangle® 5 10 ou 50 doses	T	T	T	T	T								Oui					2 mL	s.c i.m
Triangle® 10 HB 10 ou 50 doses	T	T	T	T	T				T				Oui					5 mL	s.c i.m
Fermicon 7®/Somnugen® 10 ou 50 doses						T				T								5 mL	s.c i.m
J-VAC^{MC} 10 ou 50 doses										T								2 mL	s.c i.m

Pour les vaccins énumérés ci-dessus, le délai d'attente avant l'abattage à des fins alimentaires est de 21 jours. Il n'y a pas de période de retrait du lait. | A : virus vivant atténué | T : antigène tué ou inactifé | *Contient l'adjuvant METASTIM® | s.c. : sous-cutanée | i.m. : intramusculaire | 5. Selon les étiquettes canadiennes.