

lockout®

Maintenez la ligne de défense

Chaque vache mérite la protection qu'offre un scellant à trayon.

Empêchez les bactéries d'entrer dans le pis grâce à Lockout®.




Quand c'est le temps de tarir, faites barrière aux bactéries.

La période de tarissement est essentielle au maintien de la santé du pis et pour préparer vos vaches à une lactation productive. Les infections intramammaires, lesquelles peuvent causer une mammite clinique, surviennent lorsque des bactéries pénètrent dans le pis et se multiplient.

Des études révèlent qu'une semaine après le tarissement, seulement 50 % des quartiers sont naturellement scellés par un bouchon de kératine, ce qui laisse l'autre moitié vulnérables aux infections¹.

De plus, près de 25 % des trayons n'ont aucun bouchon à la fin de la période de tarissement, ce qui les laisse sans protection pendant toute cette période¹. Ces pourcentages doublent chez les vaches produisant plus de 21 litres par jour au moment du tarissement.



Scellant interne à trayon – la protection éprouvée que méritent vos troupeaux

L'application d'un scellant interne à trayon procure une protection immédiate, constante et fiable du tarissement jusqu'au vêlage, favorisant ainsi la santé du pis, la qualité du lait et la productivité globale de la vache lors de la lactation suivante. Appliqué au moment du tarissement, le scellant interne à trayon s'intègre parfaitement à votre routine de tarissement et offre une protection constante et fiable jusqu'au vêlage.



SANTÉ DU PIS

Limite les nouvelles infections intramammaires durant la période de tarissement.



QUALITÉ DU LAIT

Réduit le nombre de cellules somatiques et les mammites cliniques au vêlage.



PRODUCTIVITÉ DE L'EXPLOITATION

Réduit le coût associé au traitement, à la main-d'œuvre et au lait jeté.




GESTION DES ANTIMICROBIENS

Permet le traitement sélectif de la vache au tarissement (antibiotique non requis).

Références fournies sur demande.

Protection durant toute la période de tarissement



Réduisez le risque de mammite dans tout troupeau

Peu importe votre approche du tarissement, l'application d'un scellant interne à trayon peut aider à réduire le risque de mammite clinique au début de la prochaine lactation². Cette pratique peut être intégrée à pratiquement toute routine de tarissement.



* Lorsque vous utilisez un scellant interne à trayon plutôt qu'un antimicrobien chez les vaches non infectées.



Offrez à vos vaches le meilleur départ possible à la prochaine lactation.

Discutez avec votre médecin vétérinaire de l'ajout d'un scellant interne à trayon à vos protocoles de tarissement.

1. Dingwell, R. T. et al. *Prev. Vet. Med.* 2004; 63, 75–89.
2. Dufour, S. et al. *Anim Health Res Rev.* 2019; 20(1):86-97.

La référence **BLEUE** de qualité des soins.

La nature n'est pas parfaite. C'est pourquoi Lockout® crée une barrière entre le pis et les bactéries présentes dans l'environnement, et ce, sans antibiotique.

Compatible avec les antibiotiques intramammaires, Lockout® s'intègre parfaitement à tous les programmes de tarissement, **offrant une expérience constante à chaque vache, à chaque fois.**


LE SCELLANT À TRAYON MIEUX CONÇU

CONCEPTION ERGONOMIQUE

Améliore la prise en main, rendant l'application plus confortable.

APPLICATION RAPIDE, FACILE ET HYGIÉNIQUE

Capuchon facile à retirer et embout court conçus pour permettre une insertion hygiénique dans le trayon.



INDICATEUR D'APPLICATION INTÉGRÉ

Permet d'assurer que chaque trayon reçoit la quantité adéquate de scellant.

PÂTE BLEUE HAUTEMENT VISIBLE

Se voit facilement à la première traite pour vous assurer que le scellant a été retiré.



Boehringer
Ingelheim

Discutez avec votre médecin vétérinaire pour découvrir pourquoi chaque vache mérite Lockout®.

LockoutBleu.ca

Lockout® est une marque déposée de Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, utilisée sous licence.
© 2026 Boehringer Ingelheim Santé Animale Canada Inc. Tous droits réservés.

