




CÓMO ADMINISTRAR CORRECTAMENTE EL SELLADOR DE PEZONES LOCKOUT® A SU GANADO LECHERO


Siga los siguientes pasos para obtener los mejores resultados durante un protocolo de secado.


- 


Asegúrese de que cada cuarto se haya ordeñado por completo.
- 


Una higiene adecuada es fundamental. Mantenga las jeringas limpias y cambie o desinfecte los guantes desechables entre cada vaca o cuando se ensucien. **NO** sumerja las jeringas en agua antes de usarlas.
- 


Sumerja los pezones en una solución germicida. Deje actuar durante 30 segundos. Seque cada pezón con una toalla limpia.
- 


En caso de que su protocolo lo indique, aplique el tratamiento antimicrobiano de secado según las instrucciones del producto.
- 


Limpie el extremo de cada pezón con un paño con alcohol al 70%, **comenzando por los pezones más alejados.**
- 


Retire la tapa del tubo de Lockout®, con la precaución de tocar la punta y **mantener la higiene adecuada.**
- 

Aplique el producto **en orden contrario al de la limpieza** (es decir, comience por los cuartos más cercanos a usted).
- 

Para cada pezón, **pellizque el pezón** donde se une a la base de la ubre. Esto ayuda a colocar la pasta Lockout® en la cisterna del pezón.
- 


Aplique Lockout® utilizando la **técnica de inserción parcial.**
- 

Se ha administrado una dosis completa cuando el indicador de aplicación se retrae completamente dentro de la jeringa. Notará que el émbolo se desplaza aproximadamente 2.5 centímetros.
- 


NO masajee el sellador de pezones Lockout® hacia el interior de la ubre.
- 

Aplique un desinfectante de pezones postordeño.

SIGA LOS SIGUIENTES PASOS PARA RETIRAR EL SELLADOR DE PEZONES LOCKOUT®

- 

Para limitar los residuos del sellador en la tubería, **EVITE** retirar Lockout® utilizando la máquina de ordeño o el sistema de ordeño robótico.
- 

Al momento del parto, desleche completamente cada pezón a mano, comenzando desde la base de la ubre y avanzando hacia la punta del pezón. Haga el despuente (forestrip) de cada pezón de 10 a 12 chorros por pezón o hasta que no observe partículas azules saliendo.
- 

Identificación: Lockout® es el primer sellador interno de pezones sin antibiótico que se presenta como una pasta azul muy visible, lo que permite diferenciarlo fácilmente de la leche al retirarlo. Si ve color azul, aún hay más sellador de pezones por retirar.
- 

Descarte la leche de las vacas recién paridas durante un mínimo de 72 horas, según el procedimiento postparto habitual. Consulte la información de retiro a continuación.

INFORMACIÓN DE RETIRO: Cuando se usa por sí solo, Lockout® no requiere un periodo de descarte de la leche ni de retiro previo al sacrificio. Si se utiliza en combinación con un tratamiento de secado, respete los tiempos de retiro del antibiótico indicados en la etiqueta.

Puede ser ingerido por los terneros sin riesgo alguno, ya que no produce efectos adversos.

LOCKOUT® es una marca registrada de Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, utilizada bajo licencia.
©2026 Boehringer Ingelheim Animal Health Canada Inc. Reservados todos los derechos.

lockout®
Para más información, visite
LockoutBlue.ca

 **Boehringer
Ingelheim**