Le plan de match de votre programme de tarissement

Même de petites améliorations durant la période de tarissement peuvent avoir un **impact majeur** sur la santé de la vache et le succès de la transition et de la prochaine lactation.

1 PROTÉGER LA SANTÉ DU PIS

Assurer une période de tarissement en santé et réduire le risque de mammite.

- Réduire la production de lait idéalement à **moins de 15 L/jour** au tarissement.
- Utiliser les **traitements antibiotiques au tarissement,** des **scellants à trayon** et des **vaccins contre la mammite** si appropriés.
- Adopter des protocoles de tarissement et d'hygiène **optimaux.**

2 PRIORISER LE CONFORT DE LA VACHE

L'entrée en lactation se déroule mieux si les vaches sont confortables.

- Maintenir une **litière propre et sèche.**
- Offrir un espace de repos adéquat :
  - 1 logette par vache en **stabulation libre.**
  - 100 pi²/vache pour les **vaches taries.**
  - 150 pi²/vache pour les **vaches en préparation au vêlage.**

3 GARDER L'ÉTABLE FRAÎCHE ET BIEN VENTILÉE

Une bonne circulation de l'air favorise la santé des vaches et la consommation alimentaire.

- Cibler un débit d'air entre **200 à 400 pieds/minute.**
- **Réduire** le stress thermique grâce à une ventilation appropriée et des stratégies de refroidissement.

4 LIMITER LE STRESS SOCIAL

Minimiser les changements sociaux favorise une meilleure transition au moment du vêlage.

- Adopter l'approche **« 2 semaines ou 2 pieds » :**
  - **Éviter** les changements de parcs ou de groupes dans les 2 semaines précédant le vêlage.
  - **Minimiser** les mouvements sociaux inutiles durant la période de tarissement.

5 ASSURER L'ACCÈS À LA NOURRITURE ET À L'EAU

Une consommation alimentaire stable favorise une transition réussie.

- Fournir **2 points d'eau ou plus** par enclos.
- Assurer au moins **3 pouces** d'accès à l'eau par vache.
- Maintenir au minimum **30 pouces** d'accès à la mangeoire par vache.
- Offrir une alimentation **équilibrée** adaptée aux vaches taries, aux vaches en préparation du vêlage et aux taures.

Communiquez avec votre médecin vétérinaire pour en savoir plus sur notre gamme de produits pour vous aider à optimiser la période de tarissement dans votre troupeau.

Lockout® BOVIKALC® Dry J-VAC®

BoehringerCattle.ca/fr

BOVIKALC® et Lockout® sont des marques déposées de Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, utilisées sous licence.
J-VAC^MC est une marque de commerce de Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc., utilisée sous licence.
Le logo J-VAC est une marque déposée de Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, utilisée sous licence.

© 2026 Boehringer Ingelheim Santé Animale Canada Inc. Tous droits réservés.

Boehringer Ingelheim